



CHEVRE - FEUILLE

Bulletin de liaison de l'association

EDITO : 2009 ... à mi parcours !

Ce 6ème Chèvre-Feuille est l'occasion de faire le point sur l'état d'avancement des différents projets conduits cette année.

2009 semble d'abord être une année favorable à notre cheptel : les conditions d'élevage sont globalement plus favorables que l'an passé. Malgré cela, l'offre en reproducteurs ne suffit pas à combler les innombrables demandes ... **Pour ceux qui auraient encore quelques sujets à proposer** (surtout des femelles), ne pas hésiter à m'en faire part : la diffusion des annonces par voie de mail aura au moins permis d'accélérer les échanges, en attendant (projet 2010) de constituer un listing des annonces fiable et consultable par tous, y compris les personnes non reliées à Internet.

Site Internet : Quelques membres du bureau se sont formés à sa gestion en mai 2009... Travaux pratiques et intégration des différentes remarques cet automne, après la saison des récoltes !

Boucs d'IA : les derniers prélèvements de boucs auront lieu cette année. **Pépinière de boucs :** un site d'accueil est actuellement à l'étude... Suite logique du programme de conservation qui passera du stade « in vitro » au stade « in vivo ».

La Présidente, Karine GUERIN.

SOMMAIRE :

Page 1

- Edito
- **Surtout n'oubliez pas ! ...**
- Prochaines dates à retenir.**

Page 2

- Rassemblement 2009 : Le Parc Naturel Régional d'Armorique nous accueille le dimanche 30 Août 2009.

Page 3

- Nos chèvres débroussailleuses retiennent l'attention de différents projets ...

Page 4

- Point technique : Gérer son herbage pour mieux contrôler le parasitisme caprin.

Pages 5-6

- Nouvelle rubrique ...
- « Rétrocaprin » sort des cartons !

Documents Jointes

Bulletin d'adhésion 2009

Comité de Rédaction :

Karine GUERIN, Jean-Paul CILLARD,
Francis DUPONT, Alain DIVO, Brigitte BERTOLDO

SURTOUT N'OUBLIEZ PAS !

⇒ **De renouveler votre adhésion 2009 !**, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait (Bulletin joint)

⇒ **L'ASP Chèvre des Fossés tiendra un stand / forum des éleveurs à Saint Rivoal, le dimanche 30 Août 2009**, en lien avec le Parc Naturel Régional d'Armorique : nous vous y attendons nombreux et seront à votre écoute.

⇒ **L'AG Ordinaire de l'association aura lieu le samedi 03 Octobre 2009 à l'Ecomusée du Pays de Rennes. (10h00)** Ce même jour sera organisé à l'Ecomusée une **bourse de vente et d'échange de reproducteurs** pour les races ovines et caprines bretonnes ... L'idée est de faciliter les échanges de reproducteurs entre éleveurs. Les modalités de cette bourse vous seront précisées lors de la convocation à l'AG.

Association de Sauvagerie et de Promotion de la Chèvre des Fossés.



Rassemblement 2009 :

**Le Parc Naturel Régional d'Armorique
nous accueille à Saint Rivoal
le dimanche 30 Août 2009**



Saint-Rivoal
Maison Cornec

Concours national du mouton d'Ouessant
Découverte de la chèvre des fossés

Marché des Énergies Paysannes
Le bois en campagne

Dimanche 30 août 2009 de 11 h à 19 h - Entrée gratuite
Démonstrations et débats - Expositions - Producteurs fermiers et artisans locaux - Repas paysan

Contacts : 02 98 81 43 94 - 02 98 81 40 99

Le Dimanche 30 Août 2009 aura lieu sur la commune de **Saint-Rivoal**, commune du Parc Naturel régional d'Armorique le **concours national du Mouton d'Ouessant**.

Cette manifestation est organisée conjointement à un **marché fermier** et à une **exposition sur la valorisation des énergies** (bois notamment).

A cette occasion, le Parc Naturel Régional d'Armorique exposera quelques uns de ses animaux, et l'**ASP Chèvre des Fossés** organise un **espace / forum ouvert à tous, avec ateliers à thème** :

- les obligations administratives pour l'élevage des caprins
- les rudiments de l'élevage des caprins : alimentation, santé, ...
- démonstrations de manipulations et soins de base sur des caprins
- panneaux de présentation de quelques élevages et expériences avec la chèvre des Fossés
- discussion autour des projets de l'association
- documentation consultable sur place
- foire aux questions...

Horaires : 11h - 19h

Renseignements au : 02.98.81.43.94
ou : 02.98.81.40.99



Association de Sauvergarde et de Promotion de la Chèvre des Fossés.



ECOGESTION :

Nos chèvres débroussailleuses retiennent l'attention de différents projets ...

Non polluantes, bien adaptées aux terrains difficiles et accidentés et faciles d'entretien, nos chèvres font petit à petit leurs preuves dans différents projets de gestion écologique des milieux, qu'ils soient (peri)-urbains ou sauvages.

Bien souvent, nos chèvres sont également l'occasion de (re)créer une animation et de participer au lien social à l'échelle d'une commune. Exemple sur la commune de la Chapelle des Fougeretz.

Jean-Paul Cillard - Secrétaire ASP Chèvre des Fossés

Des chèvres et des ânes débroussailleurs autour de l'étang

Il y a un mois, Capucine, Doréale et Capucin, deux belles chèvres et un bouc des fossés prenaient leur fonction de débroussailleuse à La Chapelle.

Hervé Gapihan, élu, explique qu'il s'agit d'une race de chèvre commune du grand Ouest qui était il y a peu de temps en voie de disparition. Comme son nom l'indique, elle était utilisée à l'entretien des talus et fossés. Elle valorisait donc un espace inculte tout en le maintenant propre. Docile et rustique, elle est aujourd'hui relancée pour sa production laitière et le débroussaillage.

« L'objectif de cette démarche est d'abord écologique, précise Hervé Gapihan. D'autre part, nous voulons éviter l'utilisation intensive de tondeuses et débroussailleuses : moins de CO², moins de bruits, moins de risques de blessures pour les ouvriers d'entretien car les pentes des bassins tampons sont plutôt raides ! »

Ce projet pour le moment est expérimental : l'Ecomusée de Rennes est disposé à vendre des chèvres à toutes les communes intéressées par cette idée.

Depuis quelques années, les cinq ânes de l'étang du Matelon sont non seulement utiles pour l'entretien



Hervé Gapihan, conseiller municipal, avec Capucine, Doréale et Capucin. Depuis un mois, ces deux chèvres et ce bouc des fossés débroussaillent les abords de l'étang du Matelon.

des terrains de la commune mais ils constituent également une attraction appréciée des familles. Durant l'été, les enfants sont même invités à faire

des petits tours à dos d'âne. En fait, « l'investissement de ces animaux est très rapidement rentabilisé », affirme cet élu « nature ».

Article tiré de Ouest-France - Vendredi 10 Juillet 2009.



POINT TECHNIQUE ...

Gérer son herbage : Espèces végétales et Surpâturage

Peut-être n'avez-vous jamais pris le temps d'observer vos prairies et vos pâtures, et d'essayer de reconnaître les différentes espèces végétales que l'on rencontre. C'est un tord ...

« La nature pour être commandée doit-être obéie »

Ce milieu ouvert est capital pour la santé de nos caprins. La grande majorité se situe en prairie de plaine artificielle, une création de l'homme datant de plusieurs centaines d'années.

La surcharge en bétail, la suppression de la polyculture, l'utilisation de matériel lourd, ont provoqué tassement et asphyxie des sols. Les strates herbacées et arbustives sont en forte interaction avec leur milieu. L'apparition et la disparition de certaines espèces végétales dans nos pâtures sont révélatrices de l'état du sol et de sa conduite. En les observant, il faut anticiper ou comprendre le dysfonctionnement, et surtout « réparer » le biotope avant qu'il ne soit trop tard.



Bouton d'or

Un grand nombre d'entre nous voit fleurir en mai, ce que l'on appelle vulgairement **le bouton d'or** (*Ranunculus Acris*). En petit nombre il indique une prairie équilibrée. Lorsqu'il est dominant, il y a surpâturage.



Grand Plantain



Pâturin annuel

Dans les prairies extrêmement pâturées, c'est le **grand plantain** (*Plantago Major*) et le **pâturin annuel** (*Poa Annuua*) qui colonisent le milieu. La densité du **trèfle blanc** (*Trifolium Repens*), bien connu de nous tous, est proportionnelle à la pression du pâturage.

La bourse du Pasteur (*Capselle Bursa-Pastoris*) bien que très comestible pour notre estomac, n'en indique pas moins un compactage des sols. L'explosion du **chardon commun** (*Cirsium Arvense*) n'arrive pas par hasard, c'est aussi l'excès d'animaux à l'hectare, provoquant l'excès de matière organique qui en est la cause.



Capselle Bourse à Pasteur

Et les solutions ? Me direz-vous...

☺ L'**alternance fauche / pâturage** sur 2 ans est idéale, car aucun apport extérieur n'est nécessaire et la biodiversité est maintenue. Ce n'est malheureusement pas possible partout

☺ La nécessité de **réduire le chargement** en caprin / hectare et fournir un complément sous forme de foin.

☺ Ne pas épandre de fumier sur la prairie, mais le transformer en **très bon compost**, qui lui, pourra être épandu à 4 tonnes/ha (sinon donnez le à un céréalier).

☺ Pratiquer le **pâturage tournant**, le « vide-sanitaire » lorsque vous en avez la possibilité.

Alain DIVO - Vice-Président ASP Chèvre des Fossés

Association de Sauvagerie et de Promotion de la Chèvre des Fossés.



NOUVELLE RUBRIQUE ...

« RÉTROCAPRIN » sort des cartons !

Étudier le passé pour mieux comprendre et interpréter le présent ... C'est le principe retenu pour cette rubrique que l'on souhaite à la fois chargée d'histoire ... et pleine de sens pour le présent ... Pour une première, un article tiré de la Revue Rustica a retenu notre attention. Bonne lecture !

Précieux lait de chèvre ...

L'éleveur caprin, même débutant, sait que les chèvres s'accouplent à l'automne et mettent bas au printemps ; bien les soigner, tous s'en croient capables, mais bien peu sont compétents.

La lactation d'une chèvre non domestiquée convient au chevreau : pas plus qu'il ne peut boire. La chèvre d'élevage, pour être rentable doit fournir bien plus de lait qu'il n'a été prévu par la nature. La chèvre libre, à moins d'hiver exceptionnellement rigoureux, trouverait dehors assez de nourriture pour mener à bien sa gestation et préparer sa petite lactation. La chèvre « civilisée » a besoin d'être copieusement nourrie pour donner du lait en abondance.



Photo : Jean-Paul Cillard

La gestation dure cinq mois ! Les trois premiers sont peu importants ; les deux derniers le sont. La lactation ne sera pas intéressante si la chèvre a été mal alimentée ces deux derniers mois.

Le lait se prépare avant la mise bas ; pas après. Gaver une pauvre chèvre squelettique qui vient d'accoucher ne lui fera pas venir du lait.

Une chèvre largement nourrie toute sa vie, quittant son bon soigneur pour échouer chez un mauvais, aura vite fait de perdre son lait ; ce qui revient à dire que les bons soins doivent être constants.

Les avortements se produisent souvent à partir du troisième mois. Accidentels, le lait monte petit à petit ; par manque de nourriture (les plus fréquents surtout chez les primipares), le lait ne vient pas.

Le jour de la parturition est le seul jour où il faille rationner la bête : tant que l'arrière-faix n'a pas été expulsé.

En élevage intensif, le seul qui ait la faveur des débutants, une sous-alimentation des deux derniers mois amène des déboires. Les chèvres de pays ne pouvant convenir à ces éleveurs enthousiastes, leurs bêtes viennent de loin, elles ne sont pas adaptées, grandes et grosses, ce sont bien plus fortes mangeuses que les chèvres locales. Elles proviennent d'élevages-sérieux où le rendement laitier compte seul et non le coût de la nourriture. Il vous est facile d'imaginer ce que peuvent produire de telles chèvres quand elles n'ont pas de quoi préparer leur lactation.

(*) : Placenta

Association de Sauvagerie et de Promotion de la Chèvre des Fossés.



Écoutons nos aïeux qui nous en disent parfois long sur les évidences oubliées, et renouons avec ce fameux « bon sens paysan » ...

RÉTROCAPRIN suite !



La meilleure chèvre, mal nourrie ne vaut pas la plus ordinaire bien soignée.

En élevage extensif, les chèvres sont en général de provenance directe du pays, rustiques, mais laitières moyennes. Que l'hiver soit rude et que la ration fourragère diminue au moment où les animaux auraient besoin d'une nourriture abondante, il s'en suivra l'inévitable faiblesse de lactation. Le mal, pourtant ne sera pas bien grand ; dans ces sortes d'élevages, il est courant d'être tributaire des saisons, sécheresse, neige, pluie tout ce qui peut gêner les bêtes. Le chevrier, n'attendant pas des prouesses de ses chèvres, n'est pas déçu.

La parturition gémellaire est de règle chez les chèvres de taille normale et d'âge adulte. Un chevreau seul naît par hasard, ou après une portée précédente trop nombreuse. Plus souvent parce que la mère est de taille insuffisante. Et encore plus fréquemment dans les troupeaux sous-alimentés.

Les brebis dans les races dites de « troupes », ne donnent qu'un agneau ; pour qu'elles en produisent deux, on a conseillé le procédé suivant : les brebis sont rationnées, puis un mois avant l'accouplement on les nourrit copieusement. Il en résulte une forte proportion de jumeaux. En aucun cas, cette méthode (qui n'est que la réplique de ce qui se passe dans les années de sécheresse dans les élevages extensifs) ne saurait être appliquée aux caprins. Le rationnement amènerait une baisse de lait ; la venue de doublés ou de triplés n'a pas la même importance que pour les brebis. Le lait de chèvre paie plus que le chevreau de boucherie.

Une chèvre adulte, vide et sèche n'a que peu de valeur. Dès qu'un acheteur crédule apparaît la chèvre vide s'intitule "présumée pleine ».

Pour l'hiver, il est indispensable de prévoir les aliments en quantité suffisante. Il est moins préjudiciable de rationner les bêtes au début. Les débutants commencent par des rations trop généreuses, pour finir par des distributions de famines ou des achats ruineux.

La marche est bonne aux chèvres pleines, non la fatigue des longs parcours ; pas de chèvres cornues parmi les mottes ; pas de bouc en liberté ; pas de chiens trop énergiques.

Il ne faut cesser de traire que lorsque la gestation est certaine : il est très difficile de faire revenir du lait à une chèvre tarie.

Toute chèvre qui "sèche" avant la fin du deuxième mois est une mauvaise bête, ou une malade, ou, le plus souvent une chèvre ne mangeant pas son content.

La chèvre entre de bonnes mains, donne plus de rapport que la vache ou la brebis. Mal soignée pendant sa gestation, elle ne donnera aucun profit.

Source : H.SMYCZINSKI - Rustica, Album 30 Du 8 septembre au 29 décembre 2003 - P1761